

# CSERESZNYE- MEGGYNAP



nébih



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

**Európai Unió**  
Európai Mezőgazdasági  
Vidékfejlesztési Alap



A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA

# Nébih Fajtakísérleti Állomásainak bemutató üzemi programja és fejlesztése

*Bemutató üzemi célok a megvalósulási  
helyszínek függvényében:*

|            |                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tordas     | kertészeti (zöldség, gyümölcs) fajok, szántóföldi és üvegházi termesztési körülmények, ökológiai gazdálkodásra alkalmas fajták vizsgálata |
| Pölöske    | kertészeti (gyümölcs) fajok vizsgálata                                                                                                    |
| Székkutas  | szántóföldi fajok vizsgálata                                                                                                              |
| Monorierdő | erdészeti fajok vizsgálata, fajtakitermesztés, burgonya rezisztenciavizsgálat                                                             |

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (továbbiakban: Nébih) Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatósága végzi a fajtaelismeréshez szükséges vizsgálatokat és a fajtakitermesztést (posztkontroll vizsgálat). A hazánkban elismert fajták az Európai Unió egész területén szaporíthatók és forgalmazhatóak.

A fajtakísérleti állomások az ország fontosabb termőterületein helyezkednek el. A fajtakísérleteket a hazai és nemzetközi jogszabályokban foglaltak figyelembevételével, egységes módszertan alapján végezzük.

*A fajtakísérleti és fajtakitermesztő állomások modernizálásával, olyan növényfajtakísérleteket lehet végezni, melyekkel limitálhatóak a mezőgazdasági termesztés bizonytalanságából adódó negatív hatások,*

növelhető a termésbiztonság, valamint a növényi kórokozók, kártevőkkel szembeni ellenállóképesség. A gazdálkodók olyan innovatív ismereteket, növénykultúrákat (fajtákat), környezetvédelmi megoldásokat ismerhetnek meg, amelyek alkalmazása révén optimalizálhatják a termelést, csökkenthetik a szennyezőanyag kibocsátást, valamint eredményesen alkalmazkodhatnak a fenntartható fejlődés feltételeihez.

# A Pölöskei Állomáshoz 75 ha földterület tartozik a Göcseji termő tájban Zala vármegyében.

A terület 8 megkülönböztetett táblára osztott. Talajfelszíne közepesen hullámos, talajerózió nem jellemző. Genetikai talajtípusa: agyagbemosódásos barna erdőtalaj. Kötöttsége: vályog-agyagos vályog, Arany-féle kötöttségi szám: 42-45. Humusztartalom: gyenge, táblánként változó, 0,7-1,5%. Az állomáson kertészeti fajok vizsgálata történik.

Bemutató üzemi látogatási programok:

1. Alma-, körte-, japánkörte nap
2. Bogyósnap
3. **Cseresznye-meggynap**
4. Diónap
5. Fagyvédelem
6. Fajtahasználat
7. Héjas nap
8. Metszési munkák bemutatása nyáron
9. Metszési munkák bemutatása télen
10. Növényvédelmi nap
11. Rezisztens szőlőfajták bemutatása
12. Szilvanap





# CSERESZNYE

(Prunus avium L.)

*Kis-Ázsiából, a Fekete- és a Kaszpi-tenger vidékéről származik. Termesztése már i.e. 70 körül megkezdődött. A cseresznye név a Kerasous (Giresun) török várostól eredeztethető.*



## Jelentősége hazánkban

A termésátlag nagyon alacsony hazánkban 3-5 t/ha (20t/ha is lehet, 10 felett már jövedelmező). Frissen fogyasztott cseresznye 60%, feldolgozásra: 30-35%, exportra: 7-8%.

## Fejlődési lehetőségeink:

- Optimális termőhely gondos kiválasztása,
- Intenzív termesztéshez megfelelő alany/nemes kombinációk kiválasztása,
- Intenzív technológiák hazai kidolgozása, fejlesztése.

## A cseresznye ökológiai igényei

- Sok napfényt kedvel, melegigényes;
- Enyhe lejtésű, napsütötte domboldalakat kedvel;
- Jól tűri a téli lehűléseket,  $-20^{\circ}\text{C}$  alatt károsodik;
- 550- 600 mm csapadék elegendő (eloszlása nagyon fontos!);
- Talajigény: tápanyagban gazdag, mélyrétegű, közepkötött homokos vályogtalajokat kedveli (5,5-7,5 pH);
- Meszes talajra érzékeny, klorotikus tünetek;
- Gyökere levegőigényes, a pangóvizet nagyon nem kedveli, talajvíz 2 m fölé ne emelkedjen.

## Alanyhasználat

### Vadcseresznye (*Prunus avium* L. Mönch.)

A legrégebben használt alany, hosszú élettartam, késői termőrefordulás, talajuntaságra érzékeny, kompatibilitási probléma nincs, igen erős növekedési erély. Fajták: ivarosan szaporított: C 2493, Altenweddingeni, vegetatíván szaporított: F/12/1, P-HL-A, P-HL-B, Colt.

### Sajmeggy (*Prunus mahaleb*)

Jól tolerálja a szélsőségesebb ökológiai körülményeket (laza, köves, meszes talajokat, szárazabb körülményeket, hidegtűrése is megfelelő), talajuntaságra nem érzékeny, jó az összeférhetősége, a vadcseresznyéhez képest korábban termőrefordul, bő termőképességű, 30-40 évig terem rajta a fajta, jó gyümölcsméretet produkál; Fajták: SL-64, Magyar, Korponay, Egervár, Broforest.



### Meggy (*Prunus cerasus*)

Főként a meggyekhez használják, erős szerteágazó gyökérzetet fejleszt, nem igényes a talajra, száraz talajt viszont nem bírja, jó a télállóképessége, hazánkban legtöbbször az apró cigánymeggyek közül szelektálták. Fajták: C 219, C 404, Weiroot 10, 13, 158, 53, 72, Gisela 5.

### Cseplesz meggy (*Prunus fruticosa*)

Ivartalanul szaporítva: 'Prob' (magyar) GM hibridek (Belgium, Grand Manil), kelet-ázsiai fajok keresztezéséből: Inmil, Damil, Camil. Németország, Pilnitzből származó alanyok: PiKu sorozat, melyek főleg növekedési erélyükben eltérőek.

## Művelési rendszerek

Hagyományos művelés: ágcsoportos, sudaras koronaforma 8-10 m x 7-8 m, kombinált korona, vázakorona

- Ágcsoportos, sudaras koronaforma 8-10 m x 7-8 m;
- Kombinált korona,
- Vázakorona.
- Intenzív koronaformák:
- Felsőrügyes orsó, fűzérorsó, módosított Brunner orsó, karcsú orsó, spanyol bokor,
- Vogel féle cseresznyeorsó, Tatura művelési rendszer, Palmetta művelési rendszer.



**'Aida':** Érd, 2006. (Brózik S. – Apostol J.); ('Moldovai fekete' x 'H 236'); Gyümölcs: nagy, igen szilárd hússzállományú; feldolgozásra alkalmas fajta, sötétpiros, cirmos, 7-8 g. Porzó fajtái: 'Katalin', 'Van', 'Kavics', 'Stella'.

Érés: június közepe.

**'Alex' ('Axel'):** Érd, 1999. (Brózik S. – Apostol J.); ('Van' x 'Cherry Self Fertile 46'); Első öntermékeny hibridünk; kemény húsu, közepes méretű; intenzív művelésre is alkalmas, aprósodásra hajlamos.

Érésidő: július első dekádjában;

**'Carmen':** Érd, 2006. (Brózik S. – Apostol J.); 'Sárga Dragán' x 'H 203'; nagyon nagy méretű, közepes hússzilárdságú, 11-12 g, Feldolgozásra mérsékelten alkalmas, gyümölcs moniliára érzékeny. ó pollenadói: 'Katalin', 'Paulus', 'Margit', 'Van'.

Érésidő: korai – közép. J

**'Germersdorfi óriás' klónok:** 3, 45.: Érd, 1982., ('Schneiders Knorpelkirsche'). Fő árufajta volt sokáig; nagy ropogós gyümölcse van, repedésre hajlamos, későn fordul termőre, feldolgozásra is alkalmas.

Érésidő: június harmadik dekádjában.



**'Kavics':** Érd, 1999; ('Germesrdorfi óriás' × 'Budakalászi fekete'), sokáig a fán tartható, szív alakú gyümölcse, nagyon kemény húsu, nagyon jó feldolgozásra is, szállítást is jól bírja. Jó pollenadói: 'Stella', 'Katalin', 'Alex'.

Érésidő: kései.

**'Mika':** Németország, Müncheberg, ismeretlen eredetű magonc, ÁE: 2023., gyümölcse barnáspiros, közepes – nagy méretű, nagyon szilárd húsállományú.

Érésidő: közepes – kései.

**'Paulus':** Érd, 2006., ('Bigarreau Burlat × 'Stella'), közepes-nagy méretű, bordó-piros, szilárd húsállományú, öntermékeny, gyümölcssúly: 9-10 g, repedésre nem hajlamos.

Érésidő: június közepe;

**'Pillangó':** Érd, 2023. (ismeretlen eredetű magonc), közepes növekedési erélyű, gyümölcse nagyméretű, színe sárga piros fedőszínnel (tarka).

Érésidő: kései – nagyon kései.



**'Regina':** Németország, Hannover: ('Schneiders Spate Knorpelkirsche' × 'Rube'), igen nagy gyümölcsméretű, sötétbordó, szilárd húsállományú, repedésre nem hajlamos. Jó pollenadói: 'Sylvia', 'Sam', 'Lambert', 'Skeena'.

Érésidő: kései.

**'Summac' ('Sweet Valentine'):** ÁE: 2011, (? × Lapins), szilárd húsállományú, közép-piros szín, jó íz, öntermékeny, gyümölcssúly: 7-8 g.

Érésidő: kései.

**'Sumtare' ('Sweethart'):** ÁE, 2011. ('Van' × 'Newstar'), Summerland, Kanada, világospiros, igen szilárd húsállományú, jó íz, gyenge növekedésű, repedésre nem hajlamos, öntermékeny, gyümölcsméret: 8-9 g.

Érésidő: közepes.

**'Vega':** 1976, CA, tarka cseresznye; nagyon jó befőttnek, igen jó ízű, jó húsállományú, 6-8 g, bőtermő, színe miatt kényes gyorsan barnul.

Érésidő: június 2. dekádja.

# MEGGY

(*Prunus cerasus* L.)

A meggy ökológiai igényei hasonlóak a cseresznyéhez, de lényegesen jobban alkalmazkodó képességű.



**Cigánymeggyek:** 'C. 7', 'C. 59', 'C. 404', Brózik Sándor – Nyújtó Ferenc, öntermékenyek, 3-4 g, jó pollenadói a Pándy meggyeknek, festőlevűek.

**'Érdi bőtermő':** Maliga Pál – Apostol János, 1970. ('Pándy' × 'Nagy angol'); öntermékeny, bőtermő, 5-6 g, 22-23 mm, gyengén festőlevű, moniliára nagyon érzékeny, talán a legjobb ízű meggy, friss fogyasztásra és ipari célra.

Érésidő: korai – közép

**'Érdi ipari':** Apostol János – Kállai T-né ('Érdi bőtermő' × 'Meteor korai'), 2014., 3 g, 19-20 mm, festőlevű, ipari felhasználásra, rázható.

Érésidő: nagyon korai.

**'Érdi jubileum':** Maliga Pál – Apostol János, 1980, ('Pándy' × 'Eugénia'), 4-5 g, 21-22 mm, igen jó beltartalmi értékek jellemzőek a fajtára, középerős növekedésű, gömbölyded koronája van, moniliás ágelhalással szemben toleráns, termőképessége nem a legjobb.

Érésidő: közepes



**'Erika':** Szabó Tibor, az Oblacsinszka fajta állományból szelektálták, öntermékeny, bőtermő, 3-4 g, apró, ipari felhasználásra, cukrászati célokra, moniliára nem fogékony.

Érésidő: közepes.

**'Fanal MF-34':** Morello Kft., (2019), a 'Fanal' német meggyfajtából szelektált fajta, 5-6 g, 22-23 mm, bőtermő, erősen festőlevű, ezért légyártásra alkalmas, frissfogyasztásra nem igazán megfelelő.

Érésidő: középkései.

**'Piramis':** Apostol János, 2004, ('M 221' × 'Meteor korai'), 8-9 g, 24-26 mm, jó ízű, friss fogyasztásra kiválóan alkalmas (primőr), cseresznyemeggy. Jó pollenadói: 'Carmen', 'Linda', 'Katalin';

Érésidő: igen korai

**'Újfehértói fürtös':** Pethő Ferenc – Szabó Tibor (1970), tájszelekció, megbízhatóan, bőven terem, hajlamos túlkötésre; 5-6 g, 22-24 mm, nagyon jó az ökológiai tűrőképessége, frissfogyasztásra és konzervipari felhasználásra egyaránt alkalmas.

Érésidő: kései

**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
**Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság**

1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.  
[portal.nebih.gov.hu](http://portal.nebih.gov.hu)  
[ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu](mailto:ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu)  
+36 1 336 9000

